



經皮穿肝膽道(膽囊)引流管留置護理指導



2024.08 制定

一、引流管留置注意事項：

(一) 引流袋不可以高過於傷口處，臥床休息須用安全別針或長尾夾固定於同側衣服下襬，勿掛於床邊及垂放地上，以免管路拉扯；下床以安全別針固定、長尾夾或是背袋使用。

1.臥床休息時

不要亂丟在床上	不要掛在床下鉤子	不要垂放地上
使用安全別針		使用長尾夾

2.下床活動時

使用安全別針	使用長尾夾	使用背袋
		
不可提高於插管處		不可以垂吊
		

(二) 隨時觀察引流液的量、性質、顏色及固定縫線處是否鬆脫。

(三) 以無菌敷料覆蓋，每七日更換一次；若紗布覆蓋，則每兩日更換。

(四) 請保持傷口周圍乾燥，洗澡時採用淋浴或擦澡並保護傷口，不可泡澡，若敷料滲濕，請隨時更換。

(五) 發生下列情況須告知醫護人員或立即就醫：

1. 發燒或寒顫。
2. 腹部或傷口疼痛不適，劇烈嘔吐。
3. 引流管阻塞、外滑或滑脫。
4. 引流管傷口紅、腫、熱、痛或有分泌物出來。

二、飲食注意事項：

採低油飲食，避免油炸、動物皮及肥肉，減少高脂肪及高膽固醇食物，如：全脂牛奶、奶油、乳酪製品、內臟類及辛辣食物等，以少量多餐方式，不可暴飲暴食。

三、無菌敷料換藥方式：

(一) 準備用物

防水敷料(中)一片	2%克菌寧	口腔棉枝一包
		

(二) 換藥步驟

1. 洗手。
2. 消毒：先移除舊的敷料，將克菌寧用倒出的方式沾濕棉枝，由傷口內往外環型消毒，範圍約直徑 7~8 公分，最後用兩枝棉枝消毒藍色管壁。(使用過的棉枝不可重複使用)
3. 覆蓋：無菌敷料覆蓋，寫上下次換藥日期。

四、一般紗布換藥方式：

(一) 準備用物

4*4 紗布	4*4 Y 型 紗布	口腔棉枝 一包	2%克菌寧	3M 紙膠
				

(二) 換藥步驟

1. 洗手。
2. 消毒：(步驟如上)
3. 覆蓋：先蓋上 4*4 Y 型紗布，再蓋上 4*4 一般紗布，紗布四邊貼上紙膠。

五、觀看完整的引流管照護影片，請掃描上方 QR code。

出院後請依照醫師指示按時返診追蹤，若有問題請隨時提出，護理人員非常樂意為您服務；出院後如有任何疑問，可利用馬偕紀念醫院健康諮詢專線：台北/淡水馬偕/兒醫(02)25713760，新竹馬偕/兒醫(03)5745098、台東馬偕(089)310150 轉 311。諮詢時間：週一至週五上午 9:00~12:00，下午 2:00~5:00。

祝您 平安健康