

使用吩坦尼麻醉止痛貼片護理指導

2004.05 制定
2023.05 修訂

一、 什麼是吩坦尼麻醉止痛貼片：

吩坦尼麻醉止痛貼片(Fentanyl)可經由皮膚吸收，釋放嗎啡止痛藥物至全身循環，進而達到控制中度至嚴重的癌症疼痛及慢性非癌疼痛；其止痛效果與其他途徑之嗎啡類藥物相同。

當病人出現胃腸道吸收不良、吞嚥困難或是便秘的情況下，經醫師評估無法使用止痛針劑或口服藥物時，可使用長效型嗎啡止痛貼片進行疼痛控制。

每片貼片於皮膚吸收12-24小時後達到穩定的藥物濃度，止痛效果可維持48~72小時，移除貼片後止痛效果仍可再維持12小時，故依醫師處方每二到三天更換一次。

二、 操作順序及注意事項：

(一)先選擇一處毛髮少、無傷口、不易出汗(乾燥)且平坦之皮膚，如：前胸、後背、上手臂、大腿外側等(需避免選擇腫瘤傷口處或疼痛部位)。



(圖一)

(二)貼片請整片使用(勿剪開)，並依醫囑指示每2或3天更換一次貼片，黏貼部位需輪替。

(三)可使用清水或酒精棉片清潔預黏貼之部位，待乾燥後撕去貼片背膠無字透明膠膜，並用手掌緊壓30秒，確保整片貼片完全與皮膚接觸，並使用

透氣膠帶加強固定(可寫上更換日期以利記憶)，如圖一。

(四)每日檢視貼片有無固定牢固。

三、 返家使用方法及注意事項：

(一)貼上及撕下貼片時，須在”止痛貼片使用登記表”，紀錄貼上及撕下貼片之時間並簽名，如：圖二。

(二)取下後廢片請勿丟棄，對折黏貼後放於原包裝袋內於返診時連同止痛貼片使用登記表，交回藥局。

(三)貼片黏貼處避免泡熱水澡或熱敷，因會影響藥物吸收。

(四)第一次使用貼片可能發生噁心嘔吐、頭暈、皮膚紅疹等不適，一般4~7天內可緩解，若仍嚴重不適，可告知醫師調整用藥。

(五)此為麻醉性止痛藥物，未經醫囑使用有致命危險，請將藥物放在兒童和寵物接觸不到的地方，使用過的貼片應對黏後放入原包裝袋，繳回(醫院)藥局銷毀。

若有問題請隨時提出，護理人員非常樂意為您服務，出院後如有任何疑問，可利用馬偕醫院健康諮詢專線—台北/淡水馬偕(02)25713760、新竹馬偕(03)5745098、台東馬偕(089)310150 轉 311，諮詢時間：週一至週五上午9：00-12：00，下午2：00-5：00。

馬偕紀念醫院 淡水分院 姓名 _____ 藥名 芬Fentanyl* 50ug(29128)吩
病歷 1日 每3日 每次 1.00 FK 共 1.00 FK
吩坦尼貼片 FENTANYL TTS 使用紀錄表 床號 _____

交付日期	2019.4.25	回收日期	2019.4.28			
藥品含量	<input type="checkbox"/> 12µg/h <input type="checkbox"/> 25µg/h	本次廢片回收量	1 片			
	<input checked="" type="checkbox"/> 50µg/h	本次核發量	1 片			
貼上貼片記錄欄		撕下貼片記錄欄		醫師簽章		
日期/時間	用量	給藥者	日期/時間	用量	操作者	
108.4.25(9)	50µg/h	陳怡琳	108.4.28(9)	50	陳怡琳	
						醫師簽章

備註：病人轉院 貼片未使用 72 小時 廢片遺失，病患或家屬簽章：
其他：_____

※1.使用貼片必須記錄；撕下的貼片請放入 FENTANYL 藥袋中，下次回診時繳回藥局。
2.請務必繳回廢片及記錄表，未繳回者，依麻藥藥品法將無法再給藥。
3.回收廢片如有短少，請於備註欄說明，如流向交待不清，則醫師不予再處方。
(請繼續翻閱背面資訊)

(圖二)

祝您 平安健康